


© видання для лікаря-практика



# Клінічна імунологія Алергологія Інфектологія

## АНТИЛЕЙКОТРИЄНОВА ТЕРАПІЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ



# МОНТЕЛ



- **1 РАЗ НА ДОБУ**
- **для дорослих та дітей з 2 років**
- **ПРОТИЗАПАЛЬНА ТА БРОНХОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ**

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Монтел 4 мг РП МОЗ № UA/16297/02 від 28.09.2017. Склад: 1 таблетка містить монтелукасту 4,0 мг. Лікарська форма: таблетки жувальні. Монтел 5 мг РП МОЗ № UA/16297/03 від 28.09.2017. Склад: 1 таблетка містить монтелукасту 5,0 мг. Лікарська форма: таблетки жувальні. Монтел 10 мг РП МОЗ № UA/16297/01 від 20.09.2017. Склад: 1 таблетка містить монтелукасту 10,0 мг. Лікарська форма: таблетки жувальні. Код АТХ R03D C03. Фармакологічні властивості. Монтелукаст є високою вибірковою і лінійною спорідненістю зв'язується з SMC1T-рецепторами, сприяючи їм значне блокування. Лувування монтелукастом пречечує бронхоспазм як на ранній, так і на пізній стадії. Показання: як додаткове лікування БА легкого та помірного ступеня; як альтернативний метод для тих пацієнтів, які не можуть застосувати інгаляційні кортикостероїди; профілактика астми, домінуючим компонентом якої є бронхоспазм, індукований фізичним навантаженням; поліпшення симптомів сезонного та щорічного алергічного риніту. Спосіб застосування та дози: для дітей віком від 2 до 5 років - 1 жувальна таблетка (4 мг) 1 раз на добу, ввечері, за 1 годину до або через 2 години після прийому їжі. Доза для дітей віком від 6 до 14 років становить: 1 жувальна таблетка (5 мг) 1 раз на добу, ввечері, за 1 годину до або через 2 години після прийому їжі. Дорослим та дітям віком від 15 років по 1 таблетці (10 мг) 1 раз на добу, ввечері. Протипоказання: гіперчутливість до монтелукасту або до інших компонентів препарату. Глобні реакції: посилення кровоточивості, реакції гіперчутливості, порушення сну, психомоторна гіперактивність, головний біль, відсуття серцебиття, біль у животі, підвищення рівня серологічних трансамінів (АЛТ, АСТ), виснаження, нудота у дітей, артралгія, міалгія, інфекції верхніх дихальних шляхів, астена/гідаiveness втомилованість, набряки. Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. ПАТ НВЦ «Борщівський ХФЗ» Україна, 03134, м. Київ, вул. Мира, 17. Тел.: (044) 205-41-23. Повна інформація про лікарський засіб в інструкції для медичного застосування.



Збірник  
клінічних  
рекомендацій



## ЗМІСТ

Кишенькове керівництво з лікування і профілактики бронхіальної астми (у дорослих і дітей старше 5 років) Global Initiative for Asthma – GINA, перегляд 2019 р. ....	5
Кишенькове керівництво Глобальної стратегії діагностики, лікування та профілактики ХОЗЛ Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD, перегляд 2019 р. ....	23
Рекомендації з лікування атопічного дерматиту Європейського дерматологічного форуму, 2019 (European Dermatology Forum) <i>Wollenberg A, Girolomoni G, Simon D et al.</i> ....	50
Гострий кашель: призначення протимікробних препаратів (NICE guideline, 2018) .....	83
Клінічні рекомендації щодо антибіотикотерапії ЛОР-інфекцій Національний інститут здоров'я і якості медичної допомоги Великобританії (The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) .....	87
Крапивниця та ангионевротический отек (Канадські рекомендації) <i>Amin Kanani, Stephen D. Betschel, Richard Warrington</i> .....	92
Підсумки міжнародних клінічних рекомендацій щодо менеджменту пацієнтів з внутрішньогоспітальною та вентилятор-асоційованою пневмоніями <i>Antoni Torres, Michael S. Niederman, Jean Chastre et al.</i> .....	103
Клінічна фармакологія неседативних антигістамінних препаратів <i>Kazubiko Yanai, Takeo Yoshikawa, Ai Yanai et al.</i> .....	114