



Медичні аспекти здоров'я жінки

№ 1-2 (122-123) 2019

Medical aspects of woman's health | Медицинские аспекты
здоровья женщины



**ПРИНЦИПОВО ІНШИЙ, НОВИЙ
МЕХАНІЗМ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗАЛІЗА⁵**

Сантеферра СИЛА В КРОВІ

1 капсула містить

Пірофосфат заліза у ліпосомі	357 мг
Аскорбінова кислота	70 мг
Фолієва кислота	200 мкг
Ціанкобаламін	1,75 мкг

Вживання рекомендується:

у випадках дефіциту заліза

- при вагітності та годуванні груддю^{1,2,3}
- при зменшеному фетоплацентарному кровообігу у вагітних³
- при залізодефіцитних анеміях⁴
- при латентному залізодефіциті
- при хронічних і тривалих кровотратах у жінок під час менструального циклу^{1,3}



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗИУМАХ З МЕДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ ТА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДАННЯХ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ТА ЛІКАРІВ. НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ. ДІЄТИЧНА ДОБАВКА ДО ЗВЧАЙНОГО РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ.



**Клінічні настанови з анестезіологічного
забезпечення в акушерстві**

Медичні аспекти здоров'я жінки Медицинские аспекты здоровья женщины

Офіційне друковане видання Асоціації акушерських анестезіологів України

Журнал для лікаря-практика

Заснований у липні 2006 р.

Періодичність видання – 8 разів на рік

Журнал представлений у базі даних «Наукова періодика України» та індексується Google Scholar



№ 1-2 (122-123) 2019

Зміст



АКУШЕРСТВО

- Клінічні настанови з анестезіологічного забезпечення в акушерстві** 5
- Магній в акушерській практиці: відомі факти та нові можливості**
І.А. Жабченко 32

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ

- Невідкладні стани та анестезіологічне забезпечення в акушерстві, гінекології та мілітарній медицині**
О. Йоскович, J. Fazakas, P.O. Ткаченко, О.А. Галушко 19

ГІНЕКОЛОГІЯ

- Трихомонадна та анаеробна інфекції як етіологічний чинник виникнення хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку. Сучасні можливості лікування**
Вл.В. Подольський, В.В. Подольський. 24
- Симптоматическая терапия вульварного и промежностного варикоза у беременных**
О.В. Дженина, В.Ю. Богачев, В.Н. Лобанов, А.Л. Боданская 46
- Мониторинг чувствительности клинических изолятов Candida spp. к противогрибковым препаратам**
В. Новикова, С. Езов 57

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

- Диагностика и лечение гирсутизма у женщин в менопаузе**
Рекомендации Эндокринологического общества 2018. 39
- Новые подходы к выбору вида специализированной медицинской помощи женщинам с острым неосложненным пиелонефритом**
С.П. Пасечников. 52
- Виважений вибір препаратів для лікування інфекцій нижніх сечовивідних шляхів у жінок в еру антибіотикорезистентності** 61

ПОДОРОЖ В ІСТОРІЮ

- Исторические аспекты изучения проблемы нетримания сечи у женщин**
В.І. Горовий 64

ЗАПИСНА КНИЖКА

- Анонс** 23
- Дайджест** 45
- Книжкова полиця** 51

БІБЛІОТЕКА
Дніпропетровської
державної медичної академії

флебодіа® 600 МГ діосмін

Дві проблеми - одне рішення!

Полегшення симптомів лімфовенозної недостатності^{1,2,3}

1 таблетка на добу

біль • тяжкість • трофічні розлади

Пролонгована дія

Флеботонік та ангіопротектор³

Швидке зменшення симптомів геморою^{3,4,5,6}

3 таблетки на добу

біль • набряк • кровотеча

Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить діосмін, що відповідає 600 мг діосміну безводного чистого.

Лікарська форма. Таблетки, вкриті півкровою оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Код АТХ C05C A03.

Показання.

- Полегшення симптомів лімфовенозної недостатності: втомленість у ногах, біль, трофічні розлади.
- Комплексне лікування функціональних станів, що супроводжуються підвищеною проникністю капілярів.
- Лікування функціональних симптомів гострого геморою.

Протипоказання.

Гіперчутливість до компонентів препарату, особливо у пацієнтів, схильних до алергічних реакцій на кошеніль червоного А (Е 124). Препарат не рекомендується застосовувати у період годування груддю.

Спосіб застосування та дози. Для перорального застосування.

- Лімфовенозна недостатність. 1 таблетка на день вранці перед сніданком. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання. Середня тривалість лікування становить 2 місяці.
- Гострий гемороїд. 2-3 таблетки на день під час прийому їжі протягом 7 днів. Якщо після лікування симптоми геморою не зникають, слід звернутися до лікаря для корекції лікування. Максимальна добова доза – 1800 мг (3 таблетки).

Побічні реакції. Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж. Рідко можливі диспептичні розлади, головний біль. Поодинокі випадки шлунково-кишкових розладів, які рідко призводять до припинення лікування.

Категорія відпуску. Без рецепта. **Виробник.** Іннотера Шузї, Франція / Innothera Souzy, France. Реєстраційне посвідчення № ЦА/8590/01/01 Наказ Міністерства охорони здоров'я України 01.08.18 № 1422

¹ R. Barbe Etude de la durée d'action du Diovenor avec contrôle par pléthysmographie, Tribune médicale, 1988, n°270, p49-50.

² Cazaubon M. et al. Etude comparative d'acceptabilité, d'efficacité et de tolérance de deux formes galéniques de diosmine 600 mg, dans le traitement des symptômes de la maladie veineuse chronique. Angiologie, 2011, vol.63, n°2.

³ SmPC Phlebodia 600 mg (diosmin). Im-coated tablet.

⁴ Chauvenet M., Libeskind M. Intérêt de la diosmine d'hémisynthèse dans la poussée hémorroïdaire aiguë. Essai multicentrique randomisé en double insu versus placebo. Rev Fr Gastro-Entérologie 1994; 303: 3-8.

⁵ Kecmanovic D. et al – The use of Phlebodia® in the management of bleeding non-prolapsed haemorrhoids. Acta Chirurgica Iugoslavica 2005, 52, 1, 115-116

⁶ Debien P., Denis J. Traitement des signes fonctionnels de la crise hémorroïdaire aiguë: Essai multicentrique, randomisé, diosmine d'hémisynthèse versus association extrait de Ginkgo biloba-heptaminol troxérutine. Med Chir Dig 1996; 25 (5): 259-64.



Представництво «Лаборація Іннотек Інтернаціональ» в Україні, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.

14056