



Медичні аспекти здоров'я жінки



№ 7-8 (128-129) 2019

Medical aspects
of woman's health

Медицинские аспекты
здоровья женщины

Скринінг та ведення тяжких менструальних
кровотеч у підлітків з порушенням системи
гемостазу

Адаптована клінічна настанова Української асоціації
лікарів дитячої та підліткової гінекології

Проблеми репродуктивного старення жінчин
и необходимость протективной anti-aging терапий

Коїтальне нетримання сечі у жінок

Нарис історії розвитку жіночої сексології



Медичні аспекти здоров'я жінки

Медицинские аспекты здоровья женщины

Офіційне друковане видання Асоціації акушерських анестезіологів України

Журнал для лікаря-практика

Заснований у липні 2006 р.

Періодичність видання — 8 разів на рік


Журнал представлений у базі даних «Наукова періодика України» та індексується Google Scholar

Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського

Google
scholar

№ 7-8 (128-129) 2019

Зміст



ГІНЕКОЛОГІЯ

Проблеми репродуктивного старіння жінки і необхідність протективної anti-aging терапії

Клиническая лекция

3.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская 5

Скринінг та ведення тяжких менструальних кровотеч у підлітків з порушенням системи гемостазу

Адапована клінічна настанова Української асоціації лікарів

дитячої та підліткової гінекології

І.Б. Вовк, І.В. Бачинська 10

Застосування тиболону в період постменопаузи

Огляд сучасних рандомізованих контрольованих клінічних досліджень

..... 21

Динамічні зміни мікробіоценозу піхви в контексті

діагностики та лікування захворювань, що супроводжуються вагінальними виділеннями

..... 37

Нові можливості лікування дисплазії шийки матки

Вол.В. Подольський, В.В. Подольський 42

АКУШЕРСТВО

Акушерські та перинатальні ризики у жінок після 35 років

Дані ретроспективного аналізу історій пологів

О.І. Буткова, І.А. Жабченко, Т.М. Коваленко. 26

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Ретроспективний аналіз поширеності статевих інфекцій серед сімейних пар

С.К. Джораєва, В.В. Гончаренко, Ю.В. Щербакова,

О.К. Іванцова, О.В. Щеголева, А.Р. Бабута 32

Коїтальне нетримання сечі у жінок

В.І. Горовий 58

СЕКСОЛОГІЯ

Нарис історії розвитку жіночої сексології

С.О. Возіанов, О.В. Ромашенко, В.М. Григоренко,


С.М. Мельников, В.В. Білоголовська, О.В. Бабич,

Л.Ф. Яковенко 47


ЗАПИСНА КНИЖКА

Анонси 2, 31, 66, 67

Книжкова полиця 20, 65



ЕМПІРИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО ВАГІНІТУ



КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВІД 85,4% ДО 96,4%
В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД ЕТІОЛОГІЇ
ВАГІНІТУ*



ЗБЕРЕЖЕННЯ
ВАГІНАЛЬНОЇ
ФЛОРИ?



ШВИДКЕ ПОЛЕГШЕННЯ
СИМПТОМІВ!



Представництво "Лабора́торія Іннотек
Інтернаціональ" в Україні, 01001, м. Київ,
вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд.6/5.

1. Bohbot JM, Mas Y, Verrière F. Relevance of a Nystatin-Neomycin-Polymyxin B association for first-line empirical local treatment of infectious vaginitis. Poster (ID 39) presented at the 12th Congress of the European Society of Gynecology-18/21 October 2017-Barcelona, Spain. Data on file.
2. Neut C, Verrière F, Nelis HJ, Coenye T. Topical treatment of infectious vaginitis: effects of antibiotic, antifungal and antiseptic drugs on the growth of normal vaginal Lactobacillus strains. Open J Obstet Gynecol. 2015;5:173-80. <http://dx.doi.org/10.4236/ojog.2015.53024>.
3. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Поліжинакс.

ПОЛІЖИНАКС (POLYGYNAK)
Склад: 1 капсула вагінальна містить несоміцину сульфату 35 000 МО, поліміксину В сульфату 35 000 МО, ністатину 100 000 МО; **Фармакотерапевтична група.** Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології. Антибіотики. Ністатин, комбінації. Код АТХ G01A A51. **Показання.** Місцеве лікування вагітиту, спричиненого чутливими до компонентів препарату мікроорганізмами, та лікування неспецифічного вагітиту. Необхідно враховувати офіційні рекомендації щодо належного застосування антибактеріальних препаратів. **Протипоказання.** Цей лікарський засіб протипоказаний у разі підвищеної чутливості до діючих або допоміжних речовин (або підвищеної чутливості до відповідної групи речовин); алергії на арахіс або сою, через наявність у складі олії соєвої; застосування діафрагм та латексних презервативів. Не рекомендується застосовувати в комбінації зі сперміцидами. **Спосіб застосування та дози.** Дорослим застосовувати інтравагінально ввечері перед сном. 1 капсулу на добу. Ввести одну капсулу глибоко у піхву, бажано в положенні лежачи. Курс лікування – 12 днів. **Побічні реакції.** Можливий розвиток контактної алергійної екзема, частіше при тривалому застосуванні (ураження можуть поширюватися далеко за межі ділянок застосування препарату). У поодиноких випадках можливе виникнення реакції місцевого подразнення, включаючи почервоніння, набряк, свербіж слизової оболонки піхви, контактний дерматит, алергічні реакції, включаючи анафілактичний шок, кропив'янку. Ризик виникнення токсичних системних ефектів (з боку нирок, органів слуху) підвищеної чутливості пацієнтів до допоміжного компонента препарату олії соєвої. **Категорія відпуску.** За рецептом. **Виробник.** Іннотера Шузі, Франція/Innotera Chouzy, France.
РП UA/10193/01/01 Наказ МОЗ №91 від 17.01.2020

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників. Підписано до друку 20.01.2020.

14059