

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ®


Том 13, № 1, 2020

АТТЕНТО®

Олмесартан+Амлодипін

КРАЩА

фіксована комбінація^{1, 2}:

 Ефективне зниження АТ^{3, 4}

 Кардіоваскулярний протективний ефект⁵
(регрес об'єму атеросклеротичної бляшки та судинної гіпертрофії)



1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу АТТЕНТО® 20/5, АТТЕНТО® 40/10.
2. Bryan Williams et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management European Heart Journal (2018) 00, 1–98.
3. Redon J, Fabia MJ. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2009 Sep;10(3):147-56.
4. Chrysant SG et al. Clin Ther. 2008 Apr;30(4):587-604.
5. De la Sierra A, Volpe MJ. Hypertens. 2013 Mar;31 Suppl: 1513-7.

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу АТТЕНТО® 20/5, АТТЕНТО® 40/10

Склад. АТТЕНТО® 20/5: 1 таблетка містить олмесартану медоксомілу 20 мг та амлодипіну бєсилату 6,944 мг (що еквівалентно амлодипіну 5 мг); АТТЕНТО 40/10: 1 таблетка містить олмесартану медоксомілу 40 мг та амлодипіну бєсилату 13,888 мг (що еквівалентно амлодипіну 10 мг).

Показання. Лікування есенціальної гіпертензії. Препарат АТТЕНТО® показаний пацієнтам, у яких монотерапія олмесартаном медоксомілом або амлодипіном не забезпечує необхідного контролю артеріального тиску.

Протипоказання. Підвищена чутливість до діючих речовин, похідних дигідропіридину або будь-якої з допоміжних речовин. Вагітність та планування вагітності. Тяжка печінкова недостатність і обструкція жовчаних шляхів. Спільне застосування АТТЕНТО® і препаратів, що містять аліскірен, протипоказано пацієнтам з цукровим діабетом або порушенням функції нирок (ШКФ <60 мл/хв/1,73 м²). Через наявність у складі препарату амлодипіну АТТЕНТО® також протипоказаний пацієнтам, у яких: тяжка артеріальна гіпертензія; шок (включаючи кардіогенний шок); порушення відтоку крові з лівого шлуночка (наприклад, при стенозі аорти тяжкого ступеня); гемодинамічно нестабільна серцева недостатність після гострого інфаркту міокарда. **Побічні реакції.** Найчастішими побічними реакціями, що виникали під час застосування препарату АТТЕНТО®, були периферичні набряки (11,3%), головний біль (5,3%) та запаморочення (4,5%) та інші.

Виробники. ДАІСІ САНКІО ЮРОП ГМБХ. БЕРЛІН-ХЕМІ АГ та інші. **Представництво:** Берлін-Хемі/А. Менаріні Україна ГмбХ.

Адреса: Київ, вул. Березняківська, 29. Тел.: (044) 494-33-88, факс: (044) 494-33-89.

Інформація про рецептурний лікарський засіб для ознайомлення фахівців охорони здоров'я.

За додатковою інформацією звертайтеся до інструкції для медичного застосування препарату № 1655

від 22.07.2019. РП № UA/13780/01/01; UA/13780/01/02.

UA_ATT_04-2019_V1_press. Затверджено до друку 29.10.2019 р.

 **BERLIN-CHEMIE**
MENARINI

 **ЗАСЛАВСЬКИЙ**
Видавельський дом

www.mif-ua.com

ЗМІСТ

CONTENTS

СТОРІНКА РЕДАКТОРА

EDITOR'S PAGE

Звернення головного редактора 1

Appeal of editor-in-chief 1

ЮВІЛЕЙ

THE JUBILEE

Юрій Сіренко — сучасний науковець та лікар 7

Yurii Sirenko — a modern scientist and physician 7

Вітаємо з ювілеєм! 10

Congratulations on the anniversary! 10

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

OFFICIAL INFORMATION

Твердження Європейського товариства гіпертензії (ESH) про гіпертензію, блокатори ренін-ангіотензинової системи та COVID-19 (12 березня 2020 року, <https://www.eshonline.org/spotlights/esh-statement-on-covid-19/>) 11

Statement of the European Society of Hypertension (ESH) on hypertension, renin-angiotensin system blockers and COVID-19 (March 12, 2020, <https://www.eshonline.org/spotlights/esh-statement-on-covid-19/>) 11

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

CLINICAL CASE

Скибчик В.А., Пилипів О.С.

V.A. Skybchyk, O.S. Pylypiv

Ефективність антигіпертензивної терапії в корекції когнітивних порушень у пацієнтів з гіпертонічною хворобою 12

Effectiveness of antihypertensive therapy in correction of cognitive impairment in hypertensive patients 12

Поветкин С.В., Лунева Ю.В.

S.V. Povetkin, Yu.V. Luneva

Изучение клинической эффективности оригинального и дженерического препаратов ивабрадина у пациентов со стабильной стенокардией напряжения (сравнительное исследование) 17

Study of clinical efficacy of original and generic drugs of ivabradine in patients with stable angina (comparative study) 17

ОГЛЯД

REVIEW

Коваль С.М., Мисниченко О.В.

S.M. Koval, O.V. Mysnychenko

Артеріальна гіпертензія і цереброваскулярні ураження: епідеміологічні, клінічні, терапевтичні та профілактичні аспекти (огляд літератури та сучасних рекомендацій) .. 23

Arterial hypertension and cerebrovascular diseases: epidemiological, clinical, therapeutic and preventive aspects (a review of the literature and current recommendations) 23

НА ДОПОМОГУ КЛІНІЦИСТУ

TO HELP CLINICIANS

Волошина І.М.

I.M. Voloshyna

Тютюнопаління vs е-сигарети: підміна гравців. Доказове лікування нікотинової залежності 35

Tobacco smoking vs e-cigarettes: substitution of players. Evidence-based treatment of nicotine addiction 35

Сіренко Ю.М., Торбас О.О.

Терапія комбінацією
периндоприлу/індапаміду/амлодипіну
з точки зору оновлених рекомендацій
і настанов 43

НОВЕ У КАРДІОЛОГІЇ

Лікування артеріальної гіпертензії
в молодих осіб: забагато ліків
або адекватне зниження ризику? 53

Статеві відмінності в траєкторіях артеріального
тиску протягом життя 53

ВООЗ визначила 13 найбільш важливих
глобальних проблем для здоров'я
у новій декаді 54

Зниження споживання алкоголю призводить
до зменшення нападів ФП 56

Нове схвалення васцепи відкриває
можливості для лікування мільйонів 58

Два кандидати препаратів риб'ячого жиру
не пройшли пізні етапи досліджень 59

Протидіабетичний препарат може бути
використаний для профілактики подагри 60

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Руководство Европейского общества кардиологов
по диагностике и лечению
хронических коронарных синдромов
от 2019 года 62

Вимоги до оформлення статей 157

Yu.M. Sirenko, O.O. Torbas

Perindopril/indapamide/amlodipine
combination therapy from the point
of view of updated recommendations
and instructions 43

ADVANCES IN CARDIOLOGY

Treatment of high blood pressure
in young people: too much medicine
or appropriate risk reduction? 53

Sex differences in blood pressure trajectories
over the life course 53

WHO names top 13 global health
challenges for the
new decade 54

Reducing alcohol consumption leads
to a decrease in atrial fibrillation episodes 56

New vascepa approval opens
up treatment to millions 58

Two fish-oil candidates
fail late-stage tests 59

An anti-diabetic drug can be used
to prevent gout 60

METHODICAL RECOMMENDATIONS

2019 European Society
of Cardiology Guidelines
for the diagnosis and management
of chronic coronary syndromes 62

Guidelines for submitting articles 157