

ГОСТРІ ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ у практиці лікаря®

2 (65) 2017

urgent.com.ua

- Гострий коронарний синдром, ускладнений ішемічним пошкодженням головного мозку
- Утоплення: сучасні підходи з позицій доказової медицини



Тигацил для лікування дорослих та дітей від 8 років

ТИГАЦИЛ (тайгецилін) має активність проти широкого спектра патогенів

- ✓ Грамнегативні організми
- ✓ Грампозитивні організми
- ✓ Анаероби
- ✓ Резистентні грамнегативні організми
- ✓ Резистентні грампозитивні організми

ТИГАЦИЛ (тайгецилін) по 50 мг у скляному флаконі, захаритому пробкою, по 10 флаконів у паціє з картону.
КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ.
 Показання до застосування. Тигацил застосовують дорослим та дітям віком від 8 років для лікування таких інфекцій: ускладнених інфекцій шкіри та м'язів тканин, за винятком інфекцій діабетичної ступні; ускладнених інфекцій черевної порожнини. Тигацил слід застосовувати тільки у випадках, коли інші антибіотики не прийняті до застосування. Слід звернути увагу на офіційні рекомендації щодо доцільності застосування антибактеріальних засобів. Протипоказання. Гіперчутливість до активної речовини чи до будь-якої з допоміжних речовин препарату, а також до інших препаратів тетрациклінового ряду. Пацієнти, які мають гіперчутливість до антибіотиків тетрациклінового ряду, можуть мати гіперчутливість до тайгециліну. Спосіб застосування та дози. Початкова рекомендована доза для дорослих становить 100 мг. Надалі застосовують по 50 мг кожні 12 годин протягом 5-14 днів. Тривалість лікування повинна залежати від тяжкості захворювання, локалізації інфекції та клінічної відповіді хворого. Тигацил вводять внутрішньовенно протягом 30 - 60 хв. Пригортаючи розчин слід використовувати негайно. Діти віком від 8 до 12 років: 1,2 мг/кг тайгециліну кожні 12 годин внутрішньовенно, максимальна доза – 50 мг кожні 12 годин протягом 5-14 днів. Для віком від 12 до 18 років: 50 мг кожні 12 годин протягом 5-14 днів. Більш детально див. Інструкцію. Пакетний склад. Національний стандарт якості та оборотні копії реалізують як порошки (21%) та розчини (13%), стерильні в ампулах, флаконах, ін'єкцій, флаконах, порожнина активного людського трилобастинного часу, порожнина протромбінового часу (ПТЧ), гіпопротромбін, гіпоплазма, заморозжена, фіблінги, дзарва, сілеу у черевній порожнині, диспепсія, запорексія, підвищення рівня АСАТ, АлаТ, гіпербілірубінемія, свербіж, висипання, головний біль, порушення загальної поведінки, порушення рівня злипає, зосту стосовно в крові, псевдомембранозний коліт. Побливає застосування. Хворим із порушенням функції нирок та пацієнтам, які знаходяться на гемодіалізі, пацієнтам з легким чи помірно важким печінкою, показати повного злику крові не потрібно. Для контролю за станом пацієнта, яким застосовують тайгецилін разом з антикоагулянтами, слід використовувати тест для визначення ПТТ або інший порівняльний тест для визначення коагуляції. Безпечність та ефективність препарату Тигацилу у дітей віком від 8 до 18 років не встановлено. Тайгецилін не слід застосовувати вагітним, оскільки виварює крайньої необхідності, коли користь для матері перевищує ризик для плода/дитини. При застосуванні Тигацилу жінкам, які годують груддю, слід проявити обережність і оцінити можливість прилучення годуваних грудним молоком. При мурзанні автомобілем та роботі з технікою необхідно врахувати можливість виникнення заморочення при застосуванні тайгециліну. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При одночасному застосуванні тайгециліну з антикоагулянтами слід ретельно контролювати стан пацієнта, використовуючи відповідні тести для визначення коагуляції. Взаємодія не впливає на фармакокінетичний профіль тайгециліну. Слід звернути увагу, що на клірин тайгециліну не впливають інгібітори чи індуктори ізоферму CYP450. При одночасному застосуванні тайгециліну з дисосомом немає потреби в корекції дози. При розширенні in vitro не було виявлено взаємодій між тайгециліном та антибіотиками інших класів, які часто застосовують у терапії. Опунтне застосування антибіотиків з оральними протизапальними засобами може знизити ефективність протизапальних засобів. Не можна водити одностанно з Тигацилом через один і той самий У-подібний катетер: амфотерицин В, ліліцій комплекс амфотерицину В, дівален, комеронал, оміранол та розчин для внутрішньовенного введення, які можуть призвести до збільшення значення рН розчину. Тигацил не слід змішувати з іншими лікарськими засобами для яких не була доведена сумісність з тайгециліном. Фармакологічні властивості. Тайгецилін – антибіотик гліцициклінового ряду, який впливає трансверсію білка у бактеріях шляхом приєднання до рибосомної субодиниці 30S та блокування виводу молекули аміно-ацил-ГНК в сайт А рибосоми, що перешкоджає включенню аміноацилних залишків у мурзанню пептиди пацієнти. Загальна взаємодія, що тайгециліну призначена бактеріостатична дія. Категорія вилучення. За ризиком. Перед використанням препарату необхідно ознайомитися з інструкцією для застосування. Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Реєстраційні посвідчення МОЗ України UA12347/01/01 від 26.07.2012. Назва Міністерства охорони здоров'я України 12.05.2016 № 438.



За додатковою інформацією звертайтеся у Представництво «Файзер Ейч. Сі. Пі. Корпорейшн» в Україні: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12. Тел. (044) 391-60-50. WUKTYG0217033


Більше інформації Ви знайдете на медичному порталі для професіоналів www.pfizermed.com.ua





Шановні читачі!

Завітайте на наш оновлений сайт. Ми сподіваємося, що кращий дизайн та вдосконалена функціональність сайту зроблять перебування на електронному ресурсі нашого видання ще приємнішим!



У оновленій версії сайту Ви знайдете:

- більш зручний пошук матеріалів, можливість сортувати їх за розділами, темами тощо;
- україномовну, російськомовну та англомовну версії видання;
- корисні посилання на авторитетні для лікарів ресурси;
- анонси найцікавіших науково-практичних заходів, присвячених гострим та невідкладним станам

ГОСТРІ ТА НЕВІДКЛАДНІ
СТАНИ
у практиці лікаря



<http://urgent.com.ua/>

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПРОБЛЕМА

Гострий коронарний синдром, ускладнений ішемічним пошкодженням головного мозку

С.М. Стаднік, В.В. Куценко, С.В. Павлишин.....5

Стан когнітивних функцій у пацієнтів із брадиаритміями і постійною електрокардіостимуляцією

С.М. Стаднік.....10

РЕАНІМАТОЛОГІЯ

Утоплення: сучасні підходи з позицій доказової медицини

І.В. Кисельова, В.В. Петриченко, А.М. Богдан, А.Й. Гарга, О.А. Галушко16

АКАДЕМІЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

Міжнародні рекомендації з моніторингу пацієнтів під час проведення інфузійної терапії

С.М. Недашківський, О.А. Галушко, Т.М. Базь.....24

Холера: особливості перебігу та інтенсивної терапії

Д.О. Дзюба, О.А. Галушко, А.С. Крилова30

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

Ведення дорослих пацієнтів із нозокоміальною і вентилятор-асоційованою пневмонією: питання і відповіді

Рекомендації Американського товариства із вивчення інфекційних захворювань та Американського торакального товариства37

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Травма органів грудної клітки – пневмоторакс

Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги48

ОРТОПЕДІЯ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Особенности течения анкилозирующего спондилоартрита в современных условиях

Е.А. Якименко, Л.В. Закатова, Н.Н. Антипова, В.В. Тбилели, В.В. Василец60

ТВОРЧИСТЬ НАШИХ АВТОРІВ

Делирий (лекція в стихах)

М.В. Бондар.....63